

Fumarato de disoproxilo de tenofovir



Marca comercial: Viread

Clase de medicamento: Inhibidor de la transcriptasa inversa análogo de los nucleósidos

El fumarato de disoproxilo de tenofovir (tenofovir DF), conocido también como Viread, es una clase de medicamento llamado inhibidor de la transcriptasa inversa análogo de los nucleósidos (NRTI). Estos productos bloquean la transcriptasa inversa, una proteína que necesita el VIH para multiplicarse.

Formas de empleo para el tratamiento del VIH/SIDA

El tenofovir DF fue autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) el 26 de octubre de 2001 para el tratamiento de la infección por el VIH junto con otros productos contra el VIH. No cura ni previene la infección por el VIH ni el SIDA ni reduce el riesgo de transmisión del virus a otras personas.

Presentación/Administración

Se fabrica en tabletas y puede tomarse con comida o solo.

Dosis diaria recomendada

La dosis recomendada de tenofovir DF es de 300 mg una vez al día. Es posible que los pacientes con deterioro de la función renal necesiten tomarlo con menos frecuencia. Algunos pacientes pueden beneficiarse de diferentes dosis de este producto. Los pacientes deben tomarlo siempre de la forma indicada en la receta médica.

Contraindicaciones

Los pacientes deben informar al médico sobre cualquier problema de salud que tengan antes de tomar este medicamento.

Posibles efectos secundarios

Además de sus efectos deseables, el tenofovir DF puede causar algunos efectos adversos. Entre los efectos secundarios graves de este medicamento están insuficiencia hepática o renal y enfermedad grave del páncreas. Los síntomas pueden incluir dolor abdominal, inapetencia, diarrea, respiración acelerada y superficial, malestar general, dolores o calambres musculares, náusea, dificultad para respirar, somnolencia, cansancio o debilidad poco comunes y vómito. Los pacientes deben informar al médico si tienen síntomas de cualquiera de estos efectos secundarios.

Otros efectos secundarios pueden ser leves y disminuir o desaparecer con el uso continuo de este medicamento. Los efectos secundarios leves comprenden malestar abdominal, diarrea, mareo, gas intestinal, cefalea y

erupción cutánea. Las personas deben informar al médico si estos efectos secundarios continúan o son molestos.

Interacción con otros medicamentos y la comida

Es preciso avisar al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

Ensayos clínicos que usan o han usado este medicamento

Para obtener información en español acerca de ensayos clínicos que estudian fumarato de disoproxilo de tenofovir, visite el sitio web de AIDSinfo: <http://www.aidsinfo.nih.gov/ClinicalTrials> y haga clic en el enlace azul en español al inicio de la página. En la casilla de búsqueda, escriba fumarato de disoproxilo de tenofovir. Esta búsqueda está limitada a ciertos ensayos clínicos patrocinados por el gobierno y traducidos al español.

Para hacer una búsqueda más completa de ensayos clínicos para el tratamiento del VIH/SIDA, visite el sitio web de [clinicaltrials.gov](http://www.clinicaltrials.gov) en <http://www.clinicaltrials.gov> para utilizar una base de datos de ensayos clínicos en inglés. En la casilla de búsqueda, escriba Tenofovir disoproxil fumarate AND HIV infections.

Fabricantes

Tenofovir disoproxil fumarate
Gilead Sciences Inc
333 Lakeside Dr
Foster City, CA 94404
(800) 445-3235

Viread
Gilead Sciences Inc
333 Lakeside Dr
Foster City, CA 94404
(800) 445-3235

Para más información

Comuníquese con su médico o un especialista en

Fumarato de disoproxilo de tenofovir



Para más información (cont.)

información sobre salud de AIDSinfo:

- al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este
- al Live Help: http://aidsinfo.nih.gov/live_help De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m., hora del este